

- ✓ 3x denně 10 mg¹
- ✓ Zlepšuje cerebrální mikrocirkulaci¹
- ✓ Nevývolává steal-effect¹

Cavinton VINPOCETINE®
Forte

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,
připravili jsme pro Vás **akreditovanou přednášku** na téma:

Závratě aneb “A přece se točí”

V přednášce naleznete **zajímavé kazuistiky a praktické rady k diagnostice závratí.**

Odborný garant projektu prim. MUDr. Petra Gregorová

Symptomatická léčba cerebrovaskulárních poruch různého původu¹

2
kredity



Poruchy koncentrace



Tinnitus



Zapomínání

Odkaz na přednášku:



<https://cavinton.slideslivehealth.cz/>



Bolest hlavy



Vertigo

Zkrácená informace o přípravcích CAVINTON, CAVINTON FORTE, CAVINTON 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Složení: jedna tableta obsahuje vinpocetinum 5 mg nebo 10 mg, jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje vinpocetinum 5 mg. **Indikace:** Cavinton, Cavinton Forte: symptomatická léčba cerebrovaskulárních poruch různého původu: ischemická hypoperfuze, různé formy ischemických hypoperfuzních stavů, vaskulární demence. Snížení psychických a neurologických následků poruchy prokrvení mozku. **Cavinton v infuzi:** u dospělých a dospívajících k léčbě následků cirkulačních poruch centrálního nervového systému, k léčbě psychických i neurologických příznaků oběhových poruch CNS (poruch paměti, afázie, apraxie, motorických poruch, závratí, bolesti hlavy atd.), při všech formách akutní i chronické insuficience mozkových cév, v oftalmologii k léčbě vaskulárních poruch chorioidy a sítnice, pro léčbu degenerace makuly a sekundárního glaukomu vyvolaného parciálními trombózami a cévními uzávěry, v otologii k léčbě sluchových poruch vaskulárního anebo toxického (iatrogenního) původu, senzorineurální ztráty sluchu a závratě labyrintového původu. **Dávkování:** Cavinton, Cavinton Forte: obvykle se užívá třikrát denně 5–10 mg (15–30 mg). Tablety se užívají vždy po jídle. Nemocní s renálním nebo jaterním onemocněním mohou být léčeni obvyklými dávkami. **Cavinton v infuzi:** doporučená úvodní dávka je 20 mg denně (2 ampule se naředí do 500–1000 ml infuzního roztoku). U závažných případů je možné podat na začátku léčby infuzi třikrát denně 10 mg. V případě potřeby je možné denní dávku postupně zvyšovat až na 1 mg/kg tělesné hmotnosti, rozdělené do tří dávek s intervalem 5–6 hodin. Cavinton koncentrát pro infuzní roztok není doporučen pro děti. Způsob podání: infuzní roztok se podává pomalou i.v. infuzí po dobu 2 hodin. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na složky přípravku. Tablety obsahují laktosu. **Cavinton v infuzi:** akutní fáze hemoragického iktu, závažná arytmie, krvácivé stavy a těžká forma ischemické choroby srdeční. **Upozornění:** Cavinton, Cavinton Forte: doporučuje se kontrolovat EKG u nemocných se syndromem prodloužení QT intervalu nebo při současném podávání vinpocetinu s léky působícími na CNS, s antiarytmiky a při antikoagulační léčbě. **Cavinton v infuzi:** může vyvolat přechodně kardiovaskulární poruchy (mírná hypotenze, tachykardie nebo extrasystoly). **Interakce:** doporučuje se opatrnost při současném podávání vinpocetinu s léky působícími na CNS, s antiarytmiky a při antikoagulační léčbě. **Cavinton v infuzi:** je chemicky inkompatibilní s heparinem, proto se s ním nesmí mísit v jedné injekční stříkačce nebo infuzní soupravě, ani se vinpocetin nesmí injekčně podávat pacientovi léčenému heparinem. **Balení:** CAVINTON 50 tablet v blistru, CAVINTON FORTE 30 a 90 tablet v blistru. Cavinton koncentrát pro infuzní roztok: 10 nebo 5 ampulí po 2 ml. **Držitel registrace:** Gedeon Richter Plc. Győmrői út 19–21, 1103 Budapest, Maďarsko. **Datum schválení:** CAVINTON 21.8.1992, CAVINTON FORTE 13. 6. 2007, CAVINTON KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK 21. 08. 1992. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznámte se se Souhrnem informací o přípravku.

Reference: 1. SPC přípravku Cavinton Forte



GEDEON RICHTER

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Na Strži 63, 140 00 Praha 4

KEDP/DAFMRD